SOLUCIÓN 2^{do} EXAMEN PARCIAL
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA (QMC - 99)
17-MAYO-2025

1. (6 pts.) Frente a cada enunciado, encierra en una circunferencia la letra V si lo planteado es correcto y una F si lo planteado es falso. (1 Punto cada una):
- a) Solución saturada tiene la cantidad de soluto máxima que el solvente puede disolver V F
- b) % volumen, soluciones donde el soluto y el disolvente son líquidos V F
- c) El aire es una mezcla heterogénea de diferentes moléculas (O₂, N₂) V F
- d) Un proceso isobárico es aquel que se da a presión constante V F
- e) Si Torricelli hubiese sido pacheño, entonces, la columna de mercurio de su barómetro hubiese alcanzado una altura de 76 cmHg V F
- f) La presión barométrica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la tierra..... V F
2. (5 Pts.) Se quiere preparar un volumen de 800 mL de una disolución de NaNO₃ al 25% en masa y una densidad de 1.15 g/ml a 25°C.
- a) ¿Qué volumen de agua y que masa de nitrato de sodio se debe mezclar?
- b) ¿Cuál es la molaridad y cuál es la molalidad de la disolución preparada?
- c) ¿Cuál es la fracción mol del soluto en esta disolución?

- I) a) 230 g NaNO₃; 690 ml H₂O, b) 3.382 M; 3.922 m, c) 0.066
- II) a) 330 g NaNO₃; 790 ml H₂O, b) 4.382 M; 4.922 m, c) 0.076
- III) a) 130 g NaNO₃; 590 ml H₂O, b) 2.382 M; 2.922 m, c) 0.056
- IV) Ninguna

SOLUCIÓN:

a)

- Para 800 mL de la solución, se calcula el peso total, el peso del NaNO₃, el volumen del agua (d = 1 g/mL)

$$\text{Peso de la solución} = 800 \text{ ml solución} \times \frac{1.15 \text{ g solución}}{1 \text{ ml solución}} = 920 \text{ g solución}$$

$$\text{Peso del NaNO}_3 = 800 \text{ ml solución} \times \frac{1.15 \text{ g solución}}{1 \text{ ml solución}} \times \frac{25 \text{ g NaNO}_3}{100 \text{ g solución}} = \mathbf{230 \text{ g NaNO}_3 \text{ (soluto)}}$$

$$\begin{aligned} \text{Peso del disolvente} &= \text{peso del H}_2\text{O} = \text{peso de la solución} - \text{peso del soluto} \\ &= (920 - 230) \text{ g} \\ &= 690 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ ml}}{1 \text{ g H}_2\text{O}} = \mathbf{690 \text{ ml H}_2\text{O}} \end{aligned}$$

b)

- Cálculo de la molaridad, se sabe que la unidad de la molaridad es = $\frac{\text{moles de soluto}}{\text{litros de solución}}$

$$\text{molaridad} = \frac{230 \text{ g NaNO}_3}{800 \text{ ml solución}} \times \frac{1000 \text{ ml solución}}{1 \text{ L solución}} \times \frac{1 \text{ mol NaNO}_3}{85 \text{ g NaNO}_3} = \mathbf{3.382 \text{ M}}$$

- Cálculo de la molalidad, se sabe que la unidad de la molaridad es = $\frac{\text{moles de soluto}}{\text{kilogramo de solvente}}$

$$\text{molalidad} = \frac{230 \text{ g NaNO}_3}{690 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{1000 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ kg H}_2\text{O}} \times \frac{1 \text{ mol NaNO}_3}{85 \text{ g NaNO}_3} = 3.922 \text{ m}$$

c)

- Cálculo de la fracción molar del soluto:

$$X_{\text{NaNO}_3} = \frac{\text{número de moles de NaNO}_3}{\text{número de moles de NaNO}_3 + \text{número de moles de H}_2\text{O}}$$

$$\text{moles de NaNO}_3 = 230 \text{ g NaNO}_3 \times \frac{1 \text{ mol NaNO}_3}{85 \text{ g NaNO}_3} = 2.706 \text{ moles}$$

$$\text{moles de H}_2\text{O} = 690 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18 \text{ g H}_2\text{O}} = 38.333 \text{ moles}$$

$$X_{\text{NaNO}_3} = \frac{2.706 \text{ moles de NaNO}_3}{(2.706 + 38.333) \text{ moles}} = 0.066$$

3. (4 Pts.) Un manómetro de mercurio se conecta a un tubo de aire para medir la presión interna. La diferencia entre los niveles del manómetro es de 15 mm y la presión atmosférica es 0.6513 atm. A partir de la figura determine la presión absoluta en el tubo.

- I) 309 mmHg
- II) 409 mmHg
- III) 510 mmHg
- IV) Ninguna

SOLUCIÓN:

$$P_a = P_b$$

$$P_a = P_{\text{tubo}}$$

$$P_b = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}}$$

$$P_{\text{tubo}} = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}}$$

$$P_{\text{tubo}} = 15 \text{ mmHg} + 495 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{tubo}} = 510 \text{ mmHg}$$

4. (5 Pts.) A un recipiente de 20 litros de capacidad y una presión absoluta de 785 mmHg se introducen 10 g de una mezcla gaseosa cuya composición centesimal en masa es de 10% de hidrógeno, 40% de acetileno (C₂H₂) y 50% de ciclopropano (C₃H₆), calcular: a) La temperatura del sistema, b) El peso molecular de la mezcla gaseosa, c) La presión parcial del acetileno.

- I) a) 225.5 K, b) 22.94 g/mol, c) 256.4 mmHg
- II) a) 325.5 K, b) 12.94 g/mol, c) 156.4 mmHg
- I) a) 125.5 K, b) 32.94 g/mol, c) 356.4 mmHg
- III) Ninguna

SOLUCIÓN:

a) $T = ?$

De la ecuación general de los gases:

$$P * V = n * R * T \quad \rightarrow \quad T = \frac{P_T * V}{n_T * R} \dots \dots \dots 1)$$

Donde:

$$n_T = n_{H_2} + n_{C_2H_2} + n_{C_3H_6} \dots \dots \dots 2)$$

$$n_{N_2} = \frac{m_{H_2}}{M_{H_2}} = \frac{1 \text{ g}}{2 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0.5 \text{ mol}$$

$$n_{C_2H_2} = \frac{m_{C_2H_2}}{M_{C_2H_2}} = \frac{4 \text{ g}}{26 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0.154 \text{ mol}$$

$$n_{C_3H_6} = \frac{m_{C_3H_6}}{M_{C_3H_6}} = \frac{5 \text{ g}}{42 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0.119 \text{ mol}$$

$$n_T = 0.5 \text{ mol} + 0.154 \text{ mol} + 0.119 \text{ mol} = 0.773 \text{ mol}$$

Reemplazando los datos en la ecuación 1)

$$T = \frac{785 \text{ mmHg} * 20 \text{ L}}{0.773 \text{ mol} * 62.4 \frac{\text{mmHg} * \text{L}}{\text{K} * \text{mol}}} = \mathbf{325.5 \text{ K}}$$

b)

$$M_{\text{mezcla gaseosa}} = ?$$

Determinación del peso molecular de la mezcla gaseosa:

$$n = \frac{m}{M} \quad \rightarrow \quad M = \frac{m}{n}$$

$$M_{\text{mezcla gaseosa}} = \frac{m_T}{n_T} = \frac{10 \text{ g}}{0.773 \text{ mol}} = \mathbf{12.94 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}$$

c)

$$P_{C_2H_2} = ?$$

$$X_{C_2H_2} = \frac{P_{C_2H_2}}{P_T} \quad \rightarrow \quad P_{C_2H_2} = X_{C_2H_2} * P_T$$

$$P_{C_2H_2} = \frac{n_{C_2H_2}}{n_T} * P_T = \frac{0.154 \text{ mol}}{0.773 \text{ mol}} * 785 \text{ mmHg} = \mathbf{156.4 \text{ mmHg}}$$

5. (5 Pts.) Un trozo de sodio metálico reacciona completamente con agua según la ecuación:

El hidrógeno generado se recoge sobre agua según la figura:

La temperatura de trabajo es 25°C, el volumen de gas es de 246 ml medido a 760 torr si la presión de vapor de agua a 25°C es de 0,0313 atm, calcular: **a)** La fracción molar de los gases recogidos sobre agua, **b)** La masa de vapor de agua

- I)** a) 0.0313, b) 0,00566 g
II) a) 0.0213, b) 0,00466 g
III) a) 0.0113, b) 0,00166 g
IV) Ninguna

SOLUCIÓN:

$$\text{a) } P_T = P_{\text{H}_2} + P_{\text{V}_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$X_{\text{H}_2} = \frac{P_{\text{H}_2}}{P_T} = \frac{P_T - P_{\text{V}_{\text{H}_2\text{O}}}}{P_T} = \frac{760\text{mmHg} - 23,79\text{mmHg}}{760\text{mmHg}} = 0,969$$

$$X_{\text{H}_2\text{O}} = 1 - 0,969 = \mathbf{0,0313}$$

$$\text{b) } P_{\text{H}_2\text{O}} * V_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}} RT}{M_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{M_{\text{H}_2\text{O}} * P_{\text{H}_2\text{O}} * V}{RT} = \frac{18 \frac{\text{g}}{\text{mol}} * 0,0313\text{atm} * 0,246\text{L}}{0,0821 \frac{\text{atmL}}{\text{Kmol}} * 298\text{K}} = \mathbf{0,00566 \text{ g}}$$

Mmolar (g/mol): O = 16; Na = 23; H = 1; C = 12; N = 14